



ANALOGUES DE LA SOMATOSTATINE

14h30-15h Session infirmières
TAILLANDIER Virginie CHU Angers
Dr ROQUIN Guillaume CHU Angers

4^{ème} Journée Patients -Soignants-ARCs
Vendredi 4 octobre 2019

Indication

- Acromégalie
- Syndrome sécrétoire en lien avec TNE
- Améliorer PFS chez patient avec TNE gastro-entéro-pancréatique

Pharmacodynamie

- Régulateur du système endocrinien endogène
- Inhibiteur d'hormone
 - Hormone de croissance
 - TSH
 - Prolactine
 - Glucagon
 - Insuline
 - Enzymes pancréatiques
- 2 analogues
 - Octréotide
 - lanréotide

Octréotide (Sandostatine®)

LP 10, 20, 30 mg




- CONSERVATION
- PREPARATION
- INJECTION

Octréotide (Sandostatine®)

LP 10, 20, 30 mg

CONSERVATION



Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière

Au frigo entre 2 et 8°C

Ne pas conserver le produit après reconstitution



Sortir le kit du frigo 30 min avant reconstitution sans dépasser 24h

Octréotide (Sandostatine®)

LP 10, 20, 30 mg



PREPARATION:

Utilisation du kit pour la reconstitution

Un nouveau composant
du solvant



Une aiguille
sécurisée




Un adaptateur pour flacon



Octréotide (Sandostatine®)

LP 10, 20, 30 mg



- **PREPARATION:** Précautions pour la reconstitution

Après le transfert du solvant dans le flacon


Laisser le flacon reposer pendant 5 min:
humidification de la poudre

Secouer modérément le flacon pendant 30
secondes: suspension laiteuse homogène

Volume injectable : 1 ml

Octréotide (Sandostatine®)

LP 10, 20, 30 mg



NET Cancer Blog

- INJECTION:
Intramusculaire
profonde
Dispositif de sécurité pour
l'élimination de l'aiguille
**Ne pas masser après
l'injection**

Lanréotide(Somatuline®)

LP 60, 90, 120 mg



- CONSERVATION
- PREPARATION
- INJECTION

Lanréotide(Somatuline®)

LP 60, 90, 120 mg

■ CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière

Au frigo entre 2 et 8°C



Sortir la seringue préremplie du frigo 30 min avant l'injection

Lanréotide(Somatuline®)

LP 60, 90, 120 mg



PREPARATION:

Sans reconstitution


Analogue en seringue pré remplie

Prête à l'emploi

Volume injectable < 0,5 ml

Lanréotide(Somatuline®)

LP 60, 90, 120 mg



- **INJECTION:**
Sous-cutanée profonde

Dispositif de sécurité automatique
pour l'élimination de l'aiguille


**Possibilité d'auto injection
pour le patient**

Ne pas masser après l'injection



Effets indésirables

- Très Fréquents



- Fréquents

